

Vaccinations

Vous trouverez ci-dessous les informations concernant les principales maladies, leurs zones à risque ainsi que les vaccinations adéquates.

- Diphtérie Tétanos Polio
- Fièvre jaune
- Hépatite A
- Fièvre typhoïde
- Méningite cérébro-spinale
- Hépatite B
- Rougeole
- Encéphalite à tiques
- Rage

Diphtérie Tétanos Polio

Les zones à risque :

Tout voyageur doit vérifier si ses vaccinations contre la Diphtérie Tétanos Polio (dTP) sont à jour avant son départ, et ce quel que soit le pays où il se rend.

La maladie :

La diphtérie est une infection bactérienne se transmettant par la salive. Elle se manifeste par une forte angine, qui peut se compliquer de paralysies respiratoires parfois fatales.

Le tétanos est dû à une bactérie qui peut contaminer toute blessure souillée par la terre, des objets ou des épineux. L'infection provoque de violentes contractures musculaires pouvant bloquer la respiration et entraîner la mort.

La poliomyélite, causée par un virus, peut être contractée en absorbant de l'eau ou des aliments contaminés, lors de baignades ou au contact d'une personne malade. Caractérisée par des paralysies plus ou moins importantes, cette maladie reste présente dans certaines régions du monde.

La vaccination :

En France, la vaccination est obligatoire pour tous les enfants.

Chez l'adulte, les rappels contre la diphtérie à dose réduite en anatoxine, le tétanos et la poliomyélite (dTP) se font à âge fixe, ceux-ci sont recommandés aux âges de 25, 45 et 65 ans. Puis, au-delà de 65 ans, un intervalle de 10 ans est recommandé entre chaque rappel, soit à 75, 85 ans, etc.

Un rappel contre la coqueluche à dose réduite en antigènes coquelucheux est recommandé à l'âge de 25 ans (dTcaP).

Fièvre jaune

Les zones à risque :

Régions intertropicales d'Afrique et d'Amérique du Sud. **Seule vaccination exigée par le règlement sanitaire international dans certains pays pour toute personne de plus de 1 an, son certificat doit alors figurer sur un carnet international de vaccination, délivré par un centre agréé.**

La maladie :

Maladie virale transmise par piqûre de moustique, mortelle dans 80 % des cas déclarés, outre de fortes fièvres, elle peut provoquer des hémorragies et un ictère sévère (coloration jaune de la peau).

La vaccination :

Obligatoire ou non, elle est indispensable dans les zones à risque et exigée par les autorités pour entrer dans de nombreux pays asiatiques en provenance de zones infectées.

- 1 seule injection, il est recommandé de la faire 10 jours avant le départ vers une zone à risque,
- validité : ce vaccin protège toute la vie après une seule injection. Attention, certains pays peuvent exiger une vaccination datant de moins de 10 ans à l'entrée, se renseigner auprès du consulat du pays avant de partir.


Pour les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants de moins de 6 à 9 mois, les personnes allergiques à l'œuf, traitées aux corticoïdes ou présentant un déficit immunitaire, des contre-indications existent, à évaluer selon les cas.

Recommandations concernant la vaccination anti-amarile, Amériques, 2011



* La vaccination anti-amarile n'est généralement pas recommandée dans les zones où l'exposition au virus est peu probable. La vaccination peut toutefois être envisagée pour une petite catégorie de voyageurs à destination de ces zones qui risquent d'être exposés au virus amaril (par exemple, séjour prolongé, forte exposition aux moustiques, impossibilité d'éviter les piqûres de moustiques). Quand ils envisagent de se faire vacciner, les voyageurs doivent tenir compte du risque de contracter le virus amaril, des conditions exigées par les pays à l'entrée sur leur territoire ainsi que des facteurs individuels prédisposant à des manifestations postvaccinales indésirables graves (par exemple, âge, état immunitaire).

Recommandations concernant la vaccination anti-amarile, Afrique, 2011



Hépatite A

Les zones à risque :

L'hépatite A est endémique en Afrique, Asie et Amérique du Sud, Amérique centrale et Océanie.

La maladie :

L'hépatite A – ou jaunisse – est due à un virus qui se transmet par l'eau, les aliments et les mains sales. Elle entraîne des troubles digestifs et un ictère (coloration jaune de la peau), avec des complications possibles.

La vaccination :

Elle concerne les personnes non immunisées dès l'âge de 1 an devant séjourner dans des pays où l'hygiène est précaire.

Les personnes ayant contracté la maladie sont immunisées à vie.

- 1 injection 2 à 3 semaines avant le départ pour la première vaccination,
- 1 rappel 6 à 12 mois plus tard. Cette seconde dose peut être administrée jusqu'à 3 ans ou 5 ans après la première injection selon la spécialité.

Fièvre typhoïde

Les zones à risque :

Toutes les régions où l'hygiène est précaire.

La maladie :

Transmise par l'eau et les aliments contaminés, elle cause de fortes fièvres et peut évoluer vers des complications digestives, cardio-vasculaires ou neurologiques graves.

La vaccination :

Particulièrement conseillée en Asie, Afrique du Nord, Afrique et Amérique du Sud, sa nécessité dépend aussi des conditions et de la durée de votre voyage. Pratiquée dès l'âge de 2 ans.

- 1 injection 2 semaines avant le départ,
- Validité : 3 ans

Méningite cérébro-spinale

Les zones à risque :

Afrique subsaharienne : zones de savane et Sahel, d'ouest en est, du Sénégal à l'Éthiopie, au moment de la saison sèche, favorable à la transmission du méningocoque (décembre à avril) ou dans toute autre zone où sévit une épidémie, dans des conditions de contact étroit et prolongé avec la population locale. L'actualité des épidémies d'infections invasives à méningocoques est consultable sur le site Internet de l'OMS à l'adresse : http://www.who.int/csr/don/archive/disease/meningococcal_disease/en/index.html

La maladie :

La bactérie méningocoque est à l'origine de cette méningite foudroyante, qui peut entraîner la mort en quelques heures. Transmise par voie orale, ses symptômes sont les suivants : fièvre, violents maux de tête et raideur de la nuque. C'est une urgence médicale sensible aux antibiotiques.

La vaccination :

Il est recommandé à tous les voyageurs se rendant en période d'épidémie dans des régions infectées par les souches sensibles de se vacciner. 1 seule injection 10-15 jours minimum avant le départ,

NB: le vaccin est exigé pour le pèlerinage de la Mecque.

Attention :

Bien que vacciné, vous pouvez transmettre l'agent de la maladie à l'un de vos proches dans les quelques jours qui suivent votre retour en France. Si vous-même ou quelqu'un de votre entourage présente les signes suivants : fièvre, maux de tête intenses, gêne importante occasionnée par la lumière, douleur ou raideur de la nuque, nausées et vomissements, il est indispensable de consulter immédiatement un médecin, en lui signalant le voyage récent de quelqu'un dans l'entourage.

Hépatite B

Les zones à risque :

Afrique, Asie, Amériques, Océanie, mais aussi Europe.

La maladie :

Maladie virale transmise par voies sexuelle et sanguine, cette hépatite s'avère mortelle dans environ 10 % des cas déclarés en France. L'infection peut se manifester par des troubles hépatiques ou ne causer aucun symptôme. Sa gravité réside dans le risque de complications tardives, type cirrhose et cancer du foie, des années parfois après l'infection.

La vaccination :

Elle est conseillée à tout âge pour des séjours prolongés ou comportant des activités à risque dans les pays en développement, où la maladie est fréquente.

- 2 injections à 1 mois d'intervalle, puis 1 injection 6 mois plus tard,
- pour une immunité plus rapide, pour les professions exposées, les personnes à risque et les séjours fréquents en zone à risque : 3 injections à 1 mois d'intervalle et rappel à 1 an.

Rougeole

Les zones à risque : Afrique, Asie, Europe.

La maladie :

La rougeole est une infection virale éruptive aiguë. Elle atteint essentiellement les enfants à partir de l'âge de 5-6 mois. La vaccination contre la rougeole, recommandée pour les enfants autour d'un an, vise surtout à éviter les complications de l'infection, comme les encéphalites, qui peuvent avoir des séquelles importantes, voire mortelles. Le virus de la rougeole se transmet par les gouttelettes de toux en suspension dans l'air.

La vaccination : La vaccination contre la rougeole est recommandée dans le calendrier vaccinal à l'âge de 12 mois. Cependant, pour les nourrissons qui doivent voyager dans tous les pays de l'ancien monde, y compris en Europe, vu les poussées épidémiques actuelles, cette vaccination peut être pratiquée dès l'âge de 6 mois, avec une dose de vaccin rougeoleux monovalent entre les âges de 6 et 8 mois. Les enfants ayant reçu le vaccin rougeoleux monovalent devront recevoir ultérieurement les deux doses de vaccin trivalent (Rougeole Oreillon Rubéole), conformément au calendrier vaccinal.

- Les personnes nées depuis 1980 et âgées de plus de 24 mois : 2 injections au total de vaccin trivalent quels que soient les antécédents vis-à-vis des trois maladies (Rougeole Oreillon Rubéole).

Rage

Les zones à risque :

Afrique, Asie, Amériques, Europe.

La maladie :

La rage se transmet par la bave, les griffures et les morsures d'animaux enragés, dans la grande majorité des cas, des animaux domestiques type chien et chat. Une blessure avec un ustensile souillé peut aussi transmettre l'infection, qui peut s'avérer mortelle si elle n'est pas traitée rapidement.

La vaccination :

En cas de soupçon de contamination, chez le sujet non vacciné, une vaccination curative doit être démarrée le plus rapidement possible dans un centre antirabique.

- Une vaccination préventive est conseillée à tous les voyageurs se rendant pour plus d'un mois dans des zones touchées, surtout en cas de trekking, camping, randonnées...
- 3 injections à J0, J7, J21 ou J28,
- en cas de morsures ou de griffures, même vacciné, vous devez vous rendre dans un centre antirabique pour recevoir des injections supplémentaires éventuelles.

Encéphalite à tiques

Les zones à risque :

Zone rurale ou forestière d'endémie (Europe centrale, orientale et septentrionale², nord de l'Asie centrale, nord de la Chine, nord du Japon) du printemps à l'automne

La maladie :

Il s'agit d'un type de méningite virale, qui peut être grave ou laisser des séquelles neurologiques. Habituellement contractée lors d'une piqûre de tique, la maladie peut aussi se transmettre par voie alimentaire, notamment par le lait cru, sauf bouilli ou pasteurisé. L'incubation dure de 7 à 15 jours.

La vaccination :

Elle est possible pour tout public, excepté pour les femmes enceintes et pour les enfants de moins de 1 an.

- 3 injections à M0, entre M1 et M3 puis entre M5 et M12.